

Diagnose	Tå skader
<p>Tå fraktur 1 DS92.4 2-5 DS92.5</p>	<p>Alm klinisk undersøgelse af fod og tæer. Ved mistanke om fraktur i 1. tå eller ved fejlstilling af 2.-5. tå, tages der rtg.</p> <p>Distorsion uden mistanke om fraktur og luxation: Plasterspica, rummelige sko m. stive såler anbefales.</p> <p>Fraktur: Dig I: Yderphalanx Udisloceret fraktur behandles med plasterspica i 3-4 uger. Disloceret fraktur, konf med mellemvagt/Traumevagt m.h.p. op.</p> <p>Grundphalanx Udisloceret fraktur behandles med plasterspica og ROM walker i 4 uger med fuld støtte og rtg. kontrol efter 7-10 dage. Disloceret fraktur i grundphalanx, konf med mellemvagt/Traumevagt m.h.p. op.</p> <p>Dig II-V: Udislocerede frakturer: plasterspica i 3-4 uger, ingen kontrol. Dislocerede frakturer og luxationer reponeres i lokal anæstesi og der anlægges plasterspica. HUSK rep. billeder. Eventuelt rtg. kontrol efter 7-10 dage; samlet bandagering 3-4 uger. Plasterspica</p> 