

Antibiotikaprofylakse i Akutmodtagelsen		
	<i>Profylakse</i>	<i>Behandling</i>
Sår (S01, S11, S21, S31, S41, S51, S61, S71, S81, S91, T01) Rene sår		Vaskes
Forurenede sår	Penicillin 2 mill. IE	1 mill. IE x 3 i 5-7 dage
Meget forurenede sår (jord, renovation, gødning...):	Penicillin 2 mill. IE	1 mill. IE x 3 i 5-7 dage OG tbl. Metronidazol 500mg x 3 i 3 dage
Sår med kontakt til knogle/ledkapsel/sene	Penicillin 2 mill. IE	1 mill. IE x 3 i 5-7 dage
Hudinfektion (erysipelas A46)		Penicillin 1 mill IE x 3 i 5-14 dage. Og/eller Dicloxacillin 1 g x 3 i op til 14 dage
Cicatriceinfektion (T81)		Steril vask og nekroser fjernes. Konfereres mhp kirurgisk revision
Brandsår (T20-T32)		Ved infektionstegn kan sølvsulfadiazin 1% salve bruges
Hudabsces (L020-DL029)		Incision og drænage. Insufficient drænage eller påvirket AT, overvej: Dicloxacillin 1 g x 3 i 5-7 dage
Bidsår (T141B) Hund/kat:	Penicillin 2 mill. IE i.v.	Amoxicillin/clavulansyre 500 mg x 3 i 10 dage
Menneske:	Penicillin 2 mill. IE i.v. evt + dicloxacillin 2 g i.v. ved "knytnævelæsion"	Amoxicillin/clavulansyre 500 mg x 3 i 10 dage
Tægebid (A69)		Penicillin 1,5 mill. IE x 3 i 10 dage Gives kun ved erythema migrans
Mindre åbne frakturer på yderphalanx	Penicillin 2 mill. IE	Penicillin 1 mill. IE x 3 i 3 dage

Tabletbehandling hvis ikke andet er anført

Ved penicillinallergi kan der som udgangspunkt behandles med Clarithromycin 500 mg x 3 eller IV Cefuroxim 1,5 g x 3.