

Diagnose	Knætraumer
<p>Akut knæ traume</p> <p>eDok 35.1.16 Primær behandling af bløddelsskader omkring knæleddet</p>	<p>Generelle bemærkninger: Vurdering af patienter med akutte knæledsdistorsioner eller andre knætraumer, der kan forårsage bristning af ledkapsel, ligamenter, menisker eller beskadigelse af bruske, er vanskelig. Undersøgelse af knæleddet bør i tvivlstilfælde kontrolleres af mellemvagten. Erfaringsmæssigt sker der en udtalt underdiagnostisering af korsbåndsskader og overdiagnostisering af meniskskader. Endvidere forveksles patellaluksationer ikke sjældent med læsion af forreste korsbånd. Når fraktur er udelukket, tager undersøgelsen sigte på at udpege tilfælde, som bør indlægges til nærmere undersøgelse, tilfælde som kan færdigbehandles på skadestuen og tilfælde, som bør ses til kontrol i Idrætstraumatologisk ambulatoriet. Der vil ved undersøgelsen ofte konstateres hæmartron. Der er yderst sjældent indikation for aspiration.</p>

Patella luxation DS83.0

eDok
35.1.16
Primær
behandling af
bløddelsskader
omkring
knæleddet

Der påvises eventuelt lukseret patella (hyppigt spontan reposition), ofte betydelig ansamling, smerter, lateral positiv apprehension, Ømhed på medial patellaretinakulum og mediale patellofemorale ligament. (diff. diagn: prox. MCL læsion).

