

Årsrapport 2020

Resutur af fødselsbristninger på AUH

På AUH fik 3352 kvinder sutureret en fødselsbristning i 2020. Det svarer til at 82 % af alle kvinder som fødte vaginalt på AUH fik en bristning, som blev sutureret efter fødslen.


Alle kvinder tilbydes tilsyn af bristningen i efterfødselsklinikken 2-3 døgn post partum.

222 kvinder blev visiteret til et ekstra tilsyn i resuturteamet og

i 50 af tilfældene blev der, i samråd med kvinden, taget beslutning om resutur. Det svarer til at 1,5% af alle bristninger der blev sutureret primært i 2020 krævede resutur.


Fordeling over bristningsgrader, som blev resutureret i 2020

angivet i antal bristninger og procent



Episiotomi og grad 2 er her adskilt, selvom episiotomi også klassificeres som grad 2 bristning. Det samme gør sig gældende for grad 1 og labia bristninger.

Succesraten over resutur af grad 1, grad 2 bristninger og episiotomi i 2020



- Succes (succesfulde resuturer 73 %, delvis succes 14 %)
- Mislykket
- Vides ikke (mødte ikke op til kontrol)

De mislykkede resuturer var 2 tilfælde med overrevet labia og 1 tilfælde med skred i perinealhud ved episiotomi.

Tendenser

Overrevet labia – I alle tilfælde, hvor en labiabristning har krævet resutur, har der været tale om overrevet labia.

Underdiagnostik – 4 tilfælde hvor bristningen primært er klassificeret som grad 1 bristning, men i forbindelse med resutur klassificeres som grad 2 bristning.

Sent suturskred af Episiotomi – 6 tilfælde med normalt tjek i EK på 2.-3. dagen med god begyndende heling, hvorefter der er suturskred på 4.-7. dagen post partum. Oftest 6.-7. dagen.

*Der er således ikke tale om at 22 % af alle bristninger i 2020 var episiotomier, men at 22 % af alle bristninger som blev resutureret var episiotomier, og ligeledes gældende for de øvrige værdier