


Hudtransplantation



5 hurtige fakta

- Er et "plaster" der lægges på et sår for hurtigere heling
- "Plasteret" tages fra på patientens krop (donorsted) og sys på såret
- Donorsted efter fuldhudstransplantat = sys sammen
- Donorsted efter delhudstransplantat = "hudafskrabning"
- En forbindelse sys på under operation & sidder i 5-7 dage = **tie-over**



Eksempler på fuldhudsdonorsted
(sys sammen under operation)

Eksempel på delhudsdonorsted
("hudafskrabning efter operation")



Delhudstransplantat hudlag

Fuldhudstransplantat hudlag

Patientforløb hudtransplantation

Plastikkirurgi Klinik & samarbejdspartnere

- Forberedelse til operation
- Operation m. hudtransplantation
- Tie-over sys på

Plastikkirurgi Klinik

ca. 5-7 dage efter operation

- Fjernelse af tie-over
- Plan for sårbehandling
- Plan for opfølgning

Kommunalt

- Hjem eller tæt på hjem
- Sårbehandling jf. behandlingsplan

(udddybes i senere slides)

Kan ændre sig ud
fra patientens
helingspotentiale

Stadier af hudtransplantat

Formål: Sikre kontakt mellem hudtransplantat og sårbund

Udpakning
5-7 dage i Plastikkirurgisk Klinik



Eksempler på tie-over forbindelse

Sker under forbindingen

Stadie 1

- Løst & blegt - lige høstet

Stadie 2

- Klæber med fibrin

Stadie 3

- Begyndende farvetagning (karindvækst)
- Violet, lilla, lyserød


Stadie 4

- Klæber, lyserød, begyndende epitelisering
- Etableret karindvækst (meshuller lukkes)

Stadie 2




Stadie 3



Stadie 4



Observationer i kommunen




- Soignering / debridering
- Fjern fibrin
- Fjern væske under hudtransplantat => prik hul med nål
- Fjern skorper
- Fjern løs hud (kanttrimning)
- Fjern epidermisløsning (naturligt) = 1-2 uger efter OP
- Fjern hypergranulationer til hudniveau




Hypergranulationer



Epidermisløsning




Skorper



Fibrin/skorper

Valg af bandage & behandling

Vurderes typisk 7-14 dage efter operation



Helet



Oplær patienten at
passe området selv

Valg af bandage & behandling

Intet



Tabt hudtransplantat
fjernes => kontakt
Plastikkirurgi Klinik for
vejledning

Blottet sene



Holde sene fugtet, fx
med levertranssalve
25%

Delvis



Fokus på sårbehandling
af defekt vha. fugtig
sårheling

Infektion



Sølvprodukt (fx physiotulle
ag eller acticoat 3) =>
kontakt Plastikkirurgi Klinik
for vejledning

Hypergranulaton




Nedklip til hudniveau
& evt. opstart af
steoridcreme

Blottet knogle



Hold knogle fugtet, fx
med levertranssalve
25%




Donorsted

Bandage fjernes 10-14 dage efter operation

Formål: Give området ro for at sikre dannelse af nye hudceller

- "Hudafskrabning" efter delhudstransplantation
- Fjernes 10-14 dage efter operation
- Bandage afbruses/løsnes m. vand
- Undgå at hive nydannede hudceller af
- Sårbehandles hver 3. dag til opheling



Patient- & pårørendeinddragelse

- Hudtransplantatet / donorstedet skifter farve og karakter over tid – kan gå op til 12 mdr. før det får ”normal hudfarve”
- Kompression i 3 mdr. hvis hudtransplantat er på arme/ben

- Pasning & pleje
- Smør med et tyndt lag creme
- Beskyt mod kulde/direkte sollys/friktion

Helt donorsted (efter delhudstransplantation)



- Pasning & pleje
- Smør med et tyndt lag creme
- Beskyt mod kulde/direkte sollys/friktion

Helt hudtransplantat



- Skift af bandage ved små defekter
- Smør med et tyndt lag creme
- Beskyt mod kulde/direkte sollys/friktion

Delvis helt hudtransplantat



- Aftagning af bandage inden luftning af hudtransplantat

Nyt hudtransplantat



- Skift micropore

Ar (efter fuldhudstransplantation)



Uanset
problemstilling tlf.
7845 6869

Kontakt Plastikkirurgisk Afdeling

